



Indicação da vacinação contra varicela na rotina dos serviços de saúde.

1. Criança entre 12 e 14 meses sem D1 de tríplice viral e não vacinada contra varicela.	Administrar D1 de tríplice viral e agendar dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) para os 15 meses de idade, considerando o intervalo mínimo de 30 dias.
2. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral e sem dose de vacina varicela.	Agendar dose de tetra viral para os 15 meses (ou D2 de tríplice viral mais varicela) considerando o mínimo intervalo de 30 dias.
3. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com uma dose da vacina varicela monovalente e não vacinada com tríplice viral.	Administrar D1 de tríplice viral, considerando o intervalo mínimo de 30 dias. Agendar a tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) para os 15 meses considerando o intervalo mínimo de 30 dias da D1 de tríplice viral.
4. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral e uma dose da vacina varicela monovalente.	Agendar a dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) para os 15 meses, considerando o intervalo mínimo de 30 dias.
5. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral e uma dose da vacina tetra viral.	Agendar a dose de varicela monovalente para os 4 anos de idade.
6. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com duas doses de vacina com componente varicela (tetra viral ou varicela monovalente).	Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada.
7. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade sem D1 de tríplice viral e não vacinada contra varicela.	Administrar D1 de tríplice viral e agendar dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) com intervalo mínimo de 30 dias. Agendar a segunda dose da vacina varicela monovalente para os 4 anos de idade, considerando o intervalo mínimo de 30 dias da tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela).
8. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade com D1 de tríplice viral e sem dose de vacina com componente varicela.	Administrar a dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) considerando intervalo mínimo de 30 dias da D1 de tríplice viral. Agendar a segunda dose da vacina varicela monovalente para os 4 anos de idade, considerando o intervalo mínimo de 30 dias da tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela).
9. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade com D1 de tríplice viral e uma dose da vacina varicela monovalente.	Administrar uma dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela), considerando intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
10. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 de tríplice viral e com uma dose da vacina tetra viral.	Agendar a dose de varicela monovalente para os 4 anos de idade, considerando intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
11. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral sem dose da vacina varicela.	Administrar uma dose da vacina varicela monovalente com intervalo mínimo de 30 dias. Agendar a segunda dose da vacina varicela monovalente para os 4 anos, considerando intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
12. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade com D1 e D2 de tríplice viral e com duas doses da vacina varicela.	Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada.
13. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com duas doses da vacina tetra viral.	Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada.
14. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) sem dose de vacina varicela.	Administrar uma dose da vacina varicela monovalente e agendar a segunda dose desta vacina com intervalo de 30 dias.
15. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com uma dose da vacina tetra viral ou da vacina varicela monovalente.	Administrar uma dose da vacina varicela monovalente, considerando o intervalo mínimo de 30 dias da dose anterior.
16. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com duas doses da vacina tetra viral ou da vacina varicela monovalente.	Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada.

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

